

BRUN KÄRRHÖK I VÄNEROMRÅDETS NORDÖSTRA DEL.

AV GÖSTA SAMUELSSON.



Vid en inventering av brun kärrhök (*Circus aeruginosus*) i Sverige 1958 av Anders Enemar, skattades det häckande beståndet till minst 150 par.* Rapporterna från nordöstra delen av Vänerområdet var bristfälliga, varför några uppgifter om brun kärrhök i detta område kunde vara av intresse. Området, som här avses, sträcker sig från de grunda vikarna Arnöfjärden i Väse och Ölmeviken väster om Kristinehamn till Åråsviken fyra mil söder om staden.



Bo av brun kärrhök, Kilsviken. Foto: Gösta Samuelsson.

Åråsviken, Kolstrandsviken och Kilsviken är de inre delarna av den stora vänervik, som skjuter in söder om Visnums-Kils halvö.


De mötas i en förvirrande övärld av ändmoräner och skär, där bladvassen nästan helt tagit överhand. Dessa vikar samt Brobytjärn, Noret och Edsvattnet jämte några andra sankmarker och Stormossen är rester av Stor-Vänern med ett högre vattenstånd. Hela detta enhetliga biotopkomplex ville Erik Rosenberg en gång kalla Visnumskilsviken.

Där finns idealiska jaktmarker för kärrhök över de vidsträckta tuvängarna, "öjorna" och bottarna, i synnerhet vid Nötön, Toksbotten och Furöbotten, där även blå kärrhök troligen häckat.

Våren 1964 iaktogs bebyggande par på nedanstående platser. Möjligen kan ytterligare något par ha häckat.

	Häckn. 1964	Vissa år
Arnöfjärden	1	2
Ölmeviken	1	2
Edsvattnet	1	—
Noret	1	2
Kilsviken	1	2
Toksbotten	1	—
Furöbotten	—	1
Kolstrandsviken	2	—
Åråsviken	1	2

Det häckande beståndet av brun kärrhök kan alltså beräknas till c:a 9—10 par.



Spanande brun kärrhök..

Foto: Olof Jönsson.

* (Se Vår Fågelvärld nr 1, 1959!)